

Data : 15/09/2018

Sede prelievo : Sigma

Dati clinici : Polipo sessile

Mat. in esame: Escissione

Sig :

Via :

Cap : Citta' :

Data di nascita: 28/04/1945 Tel:

Valutazione diagnostica

Adenoma tubulare con focale area di displasia severa-Carcinoma in situ della componente epiteliale che insiste lungo la chioma ed appare completamente escissa e con aspetti di misplacement epiteliale che raggiunge il margine profondo. Come segnalato in letteratura, appare doveroso valutare la possibilità di una resezione chirurgica.



Esame macroscopico

Formazione polipoide di cm 2,1 nella sua dimensione massima. Si ottengono 4 sezioni. 1 cestello

Esame microscopico

Lesione in esame caratterizzata da un epitelio di rivestimento che mostra lungo la chioma presenza di area caratterizzata da ghiandole con aspetti di back to back rivestite da cellule addossate tra loro. Queste presentano un nucleo ipercromatico che occupa i due terzi dello spessore epiteliale e mostra talora evidente nucleolo. Si osservano fenomeni di deplezione mucipara. Talune ghiandole mostrano un lume irregolare e raccolta di materiale necrotico intraluminale. Lo stroma accompagnatorio mostra in tale area aspetti desmoplastici. Tale area si sviluppa per mm 5.5.

In seno allo stroma è presente ampia raccolta di mucina a margini grossolanamente arrotondati. Questa raggiunge il margine di escissione profondo. In seno alla raccolta di mucina si osservano frammenti di epitelio displastico talora disposti perifericamente a circoscrivere la raccolta, talora in seno alla raccolta stessa. Nello stroma circostante sono presenti deposizione di emosiderina e fenomeni emorragici.

