

Data : 19/05/2018

Sede prelievo : Regione pretibiale dx

Dati clinici : Neoformazione

Mat. in esame: Escissione

Sig :


Via :

Cap : Citta' :

Data di nascita: 08/11/1965 Tel:

Valutazione diagnostica

**Melanoma maligno var. nodulare Clark IV**  
**Staging pT3a**



### Esame macroscopico

Losanga cutanea di cm 3,4 x 2 centrata da neoformazione di colorito scuro che si rileva sulla superficie cutanea e mostra margini irregolari. Si ottengono 4 sezioni. si includono in 2 cestelli.

### Esame microscopico

La lesione in esame mostra ampia proliferazione melanocitaria neoplastica che si approfonda nel sottostante derma in cordoni, trabecole e teche anisodimensionate per 3 millimetri. La lesione si sviluppa longitudinalmente per mm 18. Le cellule presentano un aspetto epitelioido con esteso pleomorfismo. Lungo la superficie cutanea sono presenti estesi fenomeni di spread pagetoide. Presenza focalmente di la pigmentazione melaninica accompagnatoria. Si osservano in seno alla proliferazione melanocitaria figure mitotiche atipiche. Queste sono numerose ed in ragione di 4 per millimetro quadrato

Assenza di linfociti infiltranti la lesione. Presenza di soluzione di continuità del mantello epiteliale sovrastante.. margini laterali indenni e rispettivamente a 1 e 2,4 millimetri. Margine profondo indenne e a 6,5 millimetri.

- 1) La proliferazione neoplastica mostra uno spessore verticale di 3 millimetri. sec. Breslow.
- 2) La cute sovrastante la lesione non è esulcerata
- 3) La fase di crescita della lesione è verticale (Vertical growth phase).
- 4) Assenza di linfociti infiltranti la lesione.
- 5) Le figure mitotiche sono 4 x millimetro quadrato.
- 6) Invasione linfovaskolare non identificata.
- 7) Presenti fenomeni regressivi

Dr. Antonio Pasciuto  
Specialista in Anatomia Patologica

